

IT1110038

SIC

## COL BASSET (SESTRIERE)

Comuni interessati: Sestriere

Superficie (ha): 267

Stato di protezione: nessuno

### Caratteristiche generali

Il Col Basset si trova lungo la dorsale che separa le Valli Susa e Chisone. Il territorio del SIC, posto tra quota 2.100 m e 2.700 m (tra il Monte Fraitève 2.701 m e Monte Triplex 2.507 m), comprende anche la Costa Trecceira, caratterizzata da versanti a profilo concavo e da crinali arrotondati che ben testimoniano la natura litologica facilmente erodibile del substrato, composto essenzialmente da calcescisti. Il paesaggio è quello tipico dell'ambiente alpino: il territorio è ricoperto per quasi due terzi da praterie alpine che sfumano verso le cime più alte in rocce e macereti, mentre lembi di boscaglie e lariceti con pino cembro (*Pinus cembra*) si alternano alle quote più basse.

### Ambienti e specie di maggior interesse

Nel sito sono stati rilevati 5 ambienti di interesse comunitario dotati di buona rappresentatività e di ottimo grado di conservazione. Essi sono: i ghiaioni di calcescisti alpini (8120) e quelli xerofili montani o subalpini dell'alleanza *Stipion calamagrostidis* (8160), caratterizzati dalla presenza di *Achnatherum calamagrostis* e *Centranthus angustifolius*, quest'ultimo habitat prioritario. Sono presenti nel sito le praterie alpine basifile (6170), gli arbusteti nani a *Loiseleuria procumbens* e *Vaccinium gaultherioides* (4060) e i boschi di larice e pino cembro (9420). Per quanto riguarda la flora è di rilievo la presenza di alcuni endemismi delle Alpi occidentali: *Alyssum alpestre*, *Pedicularis rosea* subsp. *allionii*



e, inserite anche nella Lista rossa nazionale, *Androsace adfinis* subsp. *brigantiaca*, *Campanula alpestris* e *Veronica allionii*.

Il valore faunistico prevalente è dato dalla presenza di interessanti popolazioni di insetti, tra cui alcuni rari o di importanza comunitaria.

Le zone arbustive ospitano numerosi lepidotteri minacciati in tutto l'arco alpino: *Aricia allous*, *Boloria napaea*, *Euphydryas cynthia*, *Melitaea varia*, *Agriades glandon*, *Polyommatus eros*, *Polyommatus icarus*, *Erebia pluto*, *E. aethiopella*, *E. aethiops*, *E. carmentis*, *E. epiphron*, *E. gorge*, *E. mnestra*, *E. pandrose*, *Coenonympha gardetta* a cui si aggiungono tra le specie di interesse comunitario: *Maculinea arion*, *Parnassius apollo* e *P. mnemosyne*,

tutti inseriti in All. IV. Sono segnalate anche numerose specie di ortotteri tipici delle alte quote: *Aeropus sibiricus*, *Anonconotus ghilianii*, *Arcyptera fusca*, *Epipodisma pedemontana*, *Glyptobothrus apricarius*, *Myrmeleotettix maculatus*, *Omocestus viridulus*, *Stenobothrus nigromaculatus*.

Per quanto riguarda i vertebrati il sito è frequentato da alcuni mammiferi tipici di questa zona alpina, il cervo (*Cervus elaphus*), il camoscio (*Rupicapra rupicapra*) ed il capriolo (*Capreolus capreolus*); è probabile anche la presenza - saltuaria - del lupo, specie prioritaria inserita negli All. II e IV della D.H., segnalato nelle circostanti aree protette del Bosco di Salbertrand e della Val Troncea.



*Campanula alpestris*, endemita delle Alpi occidentali.

Nella pagina a fianco, veduta della Costa Trecceira.

## Stato di conservazione e minacce

I problemi maggiori sono legati alla frequentazione turistica: sulle pendici del Monte Fraitève e del Col Basset le piste da sci lambiscono i margini del SIC. Il sito è attraversato da funivie e skilift pre-esistenti. In estate, si registra un notevole traffico veicolare sulla strada sterrata che attraversa l'area dirigendosi verso il Colle Blegier, il Colle dell'Assietta e il Colle delle Finestre, interessando dunque le vicine aree protette del Bosco di Salbertrand e del Parco dell'Orsiera-Rocciavrè.

## Cenni sulla fruizione

L'area del Col Basset è attraversata da alcuni sentieri che la collegano a Sestriere, a Sauze d'Oulx e al Monte Triplex.

**Riferimenti bibliografici:** 373, 448, 486